

FOLFOX・FOLFIRI 療法について

切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん および結腸癌における術後化学療法（FOLFIRI は適応なし）


（FOLFOX、FOLFIRI の他にも XELOX 療法などもあり）

また、FOLFOX・FOLFIRI 療法に分子標的薬のである

パニツマブ：Pmab（ベクティックス®） ・ヘバシマブ：BV（アバスチン®） ・セツキシマブ：Cmab（アービタックス®）

を併用することも多い

FOLFOX（5-FU+レボホリナート+オキサリプラチン）



★ 分子標的薬を併用する場合

パニツマブ（ベクティックス®）
60分
をFOLFOX開始前に投与


セツキシマブ（アービタックス®）
投与初回の場合 120分
投与2回目の場合 60分
をFOLFOX開始前に投与

ヘバシマブ（アバスチン®）
投与初回の場合 90分
投与2回目の場合 60分
3回目以降の場合30分
をFOLFOX開始前に投与

主な副作用

- ・骨髄抑制（白血球・赤血球・血小板減少など） 投与開始1～2週間後に多い 38度以上の発熱がみられたら受診
- ・末梢神経障害（手や足、口のまわりのしびれ） 日常生活に支障がみられた場合減量や休薬を検討
- ・消化器症状（吐き気・嘔吐・食欲不振・下痢）
- ・口内炎
- ・アレルギー症状（予防としてH₁・H₂ブロッカーを使用する場合もあり）
- ・皮膚障害

FOLFIRI（5-FU+レボホリナート+イリリネカン）



★ 分子標的薬を併用する場合

パニツマブ（ベクティックス®）
60分
をFOLFIRI開始前に投与

セツキシマブ（アービタックス®）
投与初回の場合 120分
投与2回目の場合 60分
をFOLFIRI開始前に投与

ヘバシマブ（アバスチン®）
投与初回の場合 90分
投与2回目の場合 60分
3回目以降の場合30分
をFOLFIRI開始前に投与

主な副作用

- ・骨髄抑制（赤血球・白血球・血小板減少など） 投与開始1～2週間後に多い 38度以上の発熱がみられたら受診
- ・下痢（イリリネカンの副作用）
早期型（投与後24時間以内）
遅発型（投与後数日～2週間）
1日4回以上の下痢が出現した場合は医師に報告
- ・消化器症状（吐き気・嘔吐・食欲不振）
- ・口内炎
- ・皮膚障害