


## XELOX (+Bv)



- ◆ 進行・再発結腸・直腸がんに対するレジメン 効果があるうちは継続
- ◆ XELOX 単独 結腸がん術後補助療法（アジュバント）でも使用可能 通常 6 か月（8クール）
- ◆ 1クール 21日間
- ◆ ゼローダ 1日 2回内服 2週服用 1週休薬（2投1休） L-OHP（+Bv）は初日に投与
- ◆ 内服は初日夕から 15日目の朝までのことが多い

**【副作用】** Bv:尿蛋白 高血圧 粘膜からの出血  
 （重篤）消化管穿孔 創傷治癒遅延 腫瘍からの出血 血栓症 可逆性後白質脳症症候群  
 XELOX:手足症候群(HFS) 末梢神経障害 消化器症状 骨髄抑制 注射部位反応 過敏症

- ◆ L-OHP による末梢神経障害は冷たいものに触れたときに症状が出やすいので冷たいものは避ける 用量依存的に出現
- ◆ 感覚がにぶくなるため火傷やけがに注意
- ◆ HFS 手だけでなく足も症状を確認 痛みがあれば休薬も検討  
 末梢神経障害や HFS の予防：保湿剤（ウレパール・ヒルドイド）や VB<sub>6</sub>、牛車腎気丸など  
 対症療法：リリカ、NSAIDs など
- ◆ Bv 投与時は定期的な血圧の測定を依頼
- ◆ L-OHP による過敏症は初回だけでなく 7クール目位で出ることあり