

TAS102療法(ロンサーフ®)

	day1	6	8	13	28
TAS102 70mg/m ² 1日2回経口内服	夕より	朝まで	夕より	朝まで	
<u>5日内服2日休薬を2回繰り返したのち、14日休薬する</u>	→		→		

体表面積：

1.07m ² 未満	35mg/回
1.07m ² 以上1.23m ² 未満	40mg/回
1.23m ² 以上1.38m ² 未満	45mg/回
1.38m ² 以上1.53m ² 未満	50mg/回
1.53m ² 以上1.69m ² 未満	55mg/回
1.69m ² 以上1.84m ² 未満	60mg/回
1.84m ² 以上1.99m ² 未満	65mg/回
1.99m ² 以上2.15m ² 未満	70mg/回
2.15m ² 以上	67mg/回

• 副作用

骨髄抑制、食欲不振、下痢、口内炎、倦怠感

※上記症状により減量等の対応が必要と考えられた場合

・10mg/日減量

→スケジュール変更はない。

TAS102による注意点

- スケジュールが複雑かつ、規格違いが混在することが多いためコンプライアンスは要注意

(例:110mg/日の場合、一回に15mgを1錠と20mgを2錠内服)

※1クール目は毎週受診することが多いが、2クール目より計10日分処方することもあるため休薬期間を守るよう指導必要。

